



The Role of Predisposing Factors in the Transmission of Zoonosis Disease

Ziaulislam Nowbahar^{*1}

1 - Department, Agriculture Faculty Mirwias Khan Nika University-Zabul

*Corresponding Author Email: dr.nowbahar21@gmail.com Tell: 0704137185

Article Info / Abstract

Pp: 60-69

Article Type:

Review

Article History:

Received:

1404/10/14

Revised:

1404/11/6

Accepted:

1404/11/22

Published online:

1404/12/14

Keywords:

Animals ,
Control ,
Humans ,
Prevention ,
Predisposing factors and
Zoonotic diseases

Zoonotic diseases are defined as diseases that can be transmitted from animals to humans, from humans to animals, as well as between humans and between animals. The transmission of zoonotic diseases is strongly influenced by several predisposing factors, posing a serious threat to both human and animal health. Therefore, this study considered it necessary to conduct a review study entitled (The Role of Predisposing Factors in the Transmission of Zoonotic Diseases). The findings of this review indicate that biological, environmental, socio-cultural, managerial, economic, and vector-related factors play significant roles in facilitating the transmission of zoonotic diseases. The results further demonstrate that zoonotic diseases not only pose a serious threat to human health but also adversely affect human-animal interactions, economic stability, and public health systems. Based on the findings of this study, it is recommended that the Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock, particularly the Livestock Directorate, and the Ministry of Public Health implement public awareness programs and seminars to educate the general population about zoonotic disease recognition, transmission pathways, prevention, and control strategies.



د ساري ناروغيو په انتقال کې د مساعدوونکي فکتورونو رول

ضياء الاسلام نوبهار *

۱- د ميرويس خان نيکه پوهنتون- زابل ، کرهڼې پوهنځي ، د مالدارۍ خانگه

* مسؤل ليکونکى ايميل: dr.nowbahar21@gmail.com ، تليفون: ۰۷۰۴۱۳۷۱۸۵

تاريخچه / نچور

ساري ناروغۍ عبارت له هغو ناروغيو څخه دى چې د انسانانو او څارويو ترمنځ متقابل انتقال لري، او هم له انسان څخه انسان او له څاروي څخه څاروي ته هم خپرېږي. چې د ساري ناروغيو په انتقال کې ځينې مساعده فکتورونه اساسي رول لري چې د انسانانو او څارويو ژوند ته يو جدي گواښ پېښوي. په دې مروړي څېړنه کې د ساري ناروغيو د انتقال په بهير کې د مساعده کوونکو فکتورونو رول څېړل شوى دى چې په موندنو کې دا ثابته شوه چې ساري ناروغيو په انتقال کې بيولوژيکي، محيطي، فرهنگي، ټولنيز، مديريتې، اقتصادي او وکتوري مساعده کوونکي فکتورونه د ساري ناروغيو په انتقال کې مهم رول لري. پايله کې ويلای شو دغه فکتورونه نه يوازې د ناروغيو د خپرېدو زمينه برابروي، بلکې د انسانانو او حيواناتو روغتيايي سيستمونه هم اغېزمن کوي. له همدې امله، د اړوندو ادارو لکه د کرنې، اوبو لگولو او مالدارۍ وزارت او د عامې روغتيا وزارت له لوري د ساري ناروغيو د مخنيوي او کنټرول لپاره اغېزمنې تگلارې او پروگرامونه پلي کول اړين دي. سربېره پر دې، د عامه پوهاوي په خاطر سمینارونو او ورکشاپونو داير شي.

ص ص: ۶۹-۶۰
نوع مقاله: مروړى
تاريخ دريافت:
۱۴۰۴/۱۰/۱۴
تاريخ مرور:
۱۴۰۴/۱۱/۶
تاريخ پذيرش:
۱۴۰۴/۱۱/۲۲
تاريخ انتشار:
۱۴۰۴/۱۲/۱۴

واژه هاى کليدى:

انسان، څاروي،
ساري ناروغۍ،
مخنيوي، کنټرول
،مساعده کوونکي
فکتورونه .

حق نشر نويسندگان. ۱۴۰۴. منتشرشده توسط. پوهنتون گندز.

وب سايت: <https://www.kundoz.edu.af/>

سريزه

د انسان د ژوند ارزښت ته په کتو، لکه څنگه چې په اسلامي لارښوونو کې هم راغلي، د يو انسان ژغورل د ټول انسانيت د ژغورلو په څېر گڼل کېږي. له همدې امله، د ساري ناروغيو مخنيوی او کنټرول ځانگړې علمي پاملرنې ته اړتيا لري. ساري ناروغي هغه ناروغيو څخه عبارت دي چې د ناروغيو رامنځته کېدونکو عاملينو له لارې په طبيعي ډول، په مستقيم يا غيرمستقيم ډول (لکه د ناقلينو له لارې)، د څارويو او انسانانو ترمنځ انتقالېږي (Jones, 2008). په تيرو وختونو کې د انسانانو، حيواناتو او د هغوي چاپيريال ترمنځ اړيکې په پراخه توگه بدلې شوي دي، چې د ساري ناروغيو د رامنځته کېدو اندازه يې لوړه کړې ده او ځينې ناروغي نوي راڅرگنده شوي او ځينې بيا دوباره رامنځته کېږي. (Petersen, 2018) تقريباً ۶۱ سلنه نوې راڅرگندېدونکې ساري ناروغي د څارويو څخه رامنځته کېږي، چې څاروي په کې يا د ناروغي د ذخيره (Reservoir)، ليږدونکي (vector) او کوربه (host) رول لوبوي او دغه ناروغي انسانانو ته انتقالولې شي (Allen, 2017). د ساري ناروغيو عوامل عبارت دي له باکټريا، ويروسونه، پرازيتونه، فنگسونه، پړوتوزوا او غير ميکروبي فکتور (Rahman, 2020). همدارنگه ساري ناروغي لاندې ډولونه لري.

Anthropozoonosis: هغه ساري ناروغي دي چې د څارويو څخه انسانانو ته انتقالېږي لکه

ليوني سپي ناروغي.

• Zooanthroposis: هغه ساري ناروغي دي چې له انسان څخه څارويو ته انتقالېږي لکه د

توبرکلوز ناروغي.

• Amphixenosis: هغه ساري ناروغيو څخه عبارت دي چې له انسان څخه حيوان ته او له څاروي

څه انسان ته انتقالېږي يعنې دوه طرفه وي لکه د سټافيلوکوکس ناروغي.

• Ezoonosis: هغه ساري ناروغيو ته وايي چې انسان په کې دکوربه رول ترسره کوي لکه پرازيتي

ناروغي جارډيا (Hubálek, 2003).

ساري ناروغي عموماً په دوو بڼو انتقالېږي: مستقيم (Direct Zoonosis)، چې د تماس له لارې له

حيوان څخه انسان ته لېږدېږي، او غير مستقيم (Indirect Zoonosis)، چې د هوا، اوبو او نورو لارو

انتقال مومي (Mortimer, 2019). د ساري ناروغيو د پېښېدو او بيا راڅرگندېدو پروسه د نفوس

او چاپيريال پورې تړلو فکتورونو تر اغېز لاندې وي، چې پکې ښاري ژوند، تغذيوي سيستمونه،


ټولنيز او فرهنگي چلندونه، اقتصادي شرايط، او چاپيريالي بدلونونه لکه د ځنگلونو له منځه وړل او

اقليمي بدلون شامل دي (Lugo, 2021; Keusch, 2009).

د ساري ناروغيو کې اخته کېدنه (Morbidity) او مړينه (Mortality) يو بل سره اړيکه


لري په ځانگړې ډول په هغو سيمو کې چې منابع يې محدود دي او هلته د څارويو روغتيا او کرنې

توليد د خطر سره مخ کيږي چې د اقتصادي او ټولنيزو زيانونو لامل گرځي (Rahman, 2020). همدارنگه په ټوله نړۍ کې ساري ناروغي د عامې روغتيا لپاره يوه جدي ستونزه گڼل کيږي چې هر کال په ميلونونو انسانان په مختلفو جغرافيو سيمو، ټولنيزو او اقتصادي مراحلو (طبقاتو) کې اغيزمن کيږي چې اصلي عوامل چې ناروغي انتقالوي میکروبي اجزاوې دي لکه باکټريا، ويروسونه، پرازيتونه او فنگسونه دي سره له دې چې چاپيريالي فکتورونه او عوامل هم د ساري ناروغيو په خپرېدو کې اساسي رول لري (Morens & Fauci, 2013). د چاپيريال فزيکي، بيولوژيکي، ټولنيز او ايکولوژيکي اړخونه ټول په چاپيريالي فکتورونو په پراخه کټگوري کې شامل دي. دغه فکتورونه کولای شي د ناروغي رامنځته کوونکو اجزاو د ژوندي پاتې کېدو، تکثير او خپرېدو لارې چارې بدلې کړي همدارنگه د کوربه د حساسيت او چلند په اغيزمن کېدو سره د ساري ناروغيو په خپرېدو او انتقال په مستقيم او غير مستقيم اثر لري. دښه عامه روغتيايي پاليسي جوړونې لپاره ضروري ده چې چاپيريالي فکتورونه او د ناروغيو انتقال او خپرېدو ترمخ اړيکې په مکمل ډول سره وپيژندل شي چې د میکروب ضد مقاومت، نړيوال او اقليمي بدلونه هغه نوي ساري گواښونه او ننگونې دي چې د ناروغيو په انتقال چاپيريالي عوامل په دوامداره توگه په پام کې نيولو اړتيا روښانه کوي. سره له دې چې د واکسين، انټي مايکروبيال درملنې، او عامه روغتيايي اقداماتو له لارې د ساري ناروغيو په کنټرول کې مهم پرمختگ شوی دی (Patz, 2000). د ځنگلونو پرېکولو (Deforestation) عمل د ساري ناروغيو د بيا خپرېدو لامل گرځيدلې دی ځکه چې ساري ناروغي اصلا د ځنگلونو په شنو برخو کې تر کنټرول لاندې وه او دمچانو او بيزوگانو ترمخ په انزوويټيک دوره (Enzootic cycle) خپرېده خو کله چې ځنگلونو ونې پرې شوي نو دا ناروغي د ځنگل سطحې څخه ځمکې ته رابښکته شوه او بيا انسانانو ته انتقال شوه (Norris, 2004).



۱ انځور: د چاپیریالي فکتورونو له جملې څخه د ځنگلونو پرې کول د ځنگلونو جوړښت بدلوي، canopy له منځه وړي او د ځمکې هغه برخه چې مخکې خوندي ښکاره کېږي له دې امله د خاورې او اوبو حوضونو رامنځته کېږي چې د لیردونکو لکه مچانو شمیر زیاتېږي او هغه موجودات چې مخکې په canopy کې اوسیدل اوسې د انسانانو نږدې سیمو ته راښکته کېږي ښایي چې ساري ناوړغۍ انسانانو ته انتقال خطر لوړوي.

اقلیمي بدلون د ناقیلنو شمېر زیاتوالي چې د انسانانو او څارویو ترمنځ اړیکه زیاتوي چې په پایله کې د ساري ناروغیو د راڅرګندیدو او خپریدو خطر لوړوي چې په لاندې دوهم انځور کې واضح شوی هم دی (Sachan, 2010).



۲ انځور: اقلیمي بدلونونه نه یوازې تودوخې بدلونونو پورې محدود نه دي بلکې د تودوخې، وړښت، رطوبت او اقلیمي ښو بې نظامي د ناقیلنو او څارویو د سلوک بڼه بدلوي چې پایله کې په انسانانو کې د ساري ناروغیو په وړاندې د اخته کیدو خطر لوړوي.

د موضوع اهمیت:

دڅېړنې اهمیت په دې کې دی چې د ساري ناروغیو انتقال یوازې د ناروغ رامنځته کیدونکي عاملینو له شتون سره نه محدودېږي، بلکې د یو شمېر مساعده کوونکو فکتورونو تر اغېزو لاندې رامنځته کېږي چې د ناوړغۍ د خپریدو لپاره زمینه برابروي. دا فکتورونه لکه چاپیریالي بدلونونه، انساني سلوک او چلندونه، ټولنیز او اقتصادي شرایط، اقلیمي بدلونونه، ژوند ښاري کیدل، انسان او څارویو ترمنځ نږدې اړیکې چې د ناروغیو د انتقال بهیر چټکوي او داخه کیدو خطر زیاتوي. نود دغو مساعده کوونکو فکتورونو د رول څېړنه ځکه مهمه ده چې د ناروغۍ د انتقال اصلي لارې او لور خطر لرونکي شرایط په ګوته کوي او د مخنیوي اغېزمنو تګلارو د طرحې زمینه برابروي. دا ډول څېړنه د عامې روغتیا د پالیسۍ پیاوړتیا، د ناروغیو د کنټرول پروګرامونو ښه والی، او د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره بنسټیز ارزښت لري.

د څېړنې موخې:

د ساري ناروغیو په انتقال کې مساعده کوونکو فکتورونو رول.

د ساري ناروغيو په انتقال کې د انسانانو او څارويو ترمنځ د اړيکو څېړل.
د عامې روغتيا د پاليسۍ او ناروغيو د کنټرول لپاره علمي سپارښتې وړاندې کول.

د څېړنې کړنلاره:

ياده څېړنه يوه کتابتوني (مروري) مطالعه ده، چې د نړۍ له معتبرو علمي کتابونو، څېړنيزو مقالو، مجلو او انټرنېټي سرچينو څخه په استفادې ترسره شوې ده. د دې مطالعې موخه دا ده چې د ساري ناروغيو په انتقال کې د مساعده کوونکو فکتورونو رول تر عنوان لاندې اړوند معلومات په منظم ډول راټول، تحليل او ترکيب شي، تر څو د مالدارانو او مسلکي اشخاصو لپاره د مطالعې او عملي استفادې وړ علمي سرچينه برابره شي.

د څېړنې نتيجه:

د دې څېړنې موندنو څخه دا ثابته شوه چې ساري ناروغي د انسانانو او څارويو ترمنځ مشترکه ناروغي گڼل کيږي چې له څارويو څخه انسانانو ته او له انسانانو څخه څارويو ته په مستقيم او غير مستقيم ډول انتقالېږي. ساري ناروغيو په رامنځته کيدو کې مختلف عوامل لکه باکټريايي، ورسونه، فنگسونه او پرازيتونه دي چې د ساري ناروغيو په انتقال کې ځيني مساعده کوونکي فکتورونه لکه محيطي، بيولوژيکي، فرهنگي او ټولنيز، اقتصادي، مديريتې او وکتوري فکتورونه خاص رول لري چې نوموړي فکتورونه په لاندې ډول تشرېح شوي.

• محيطي فکتورونه: ژوند ښاري کيدل (Urbanization) سره د ساري ناروغيو د خطر په زياتيدو کې مهم رول لري چې پايله کې په ښارونو کې د خلکو زياتوالي په اساس د تماس فرصتونه ډيرېږي او د ناروغيو خپرېدو چانس زياتوي چې د خلکو او اهلي څارويو مهاجرت د ناروغيو نوي فرصتونه رامنځته کوي ځکه چې میکروب يا ناروغي له يوې ساحې څخه بلې ساحې ته انتقالېږي او همدارنگه اقليمي شرايط تودوخه، بارانونه، ځمکې کارونې بدلونونه لکه دښار پراختيا، کرنيزو ځمکې کموالی او طبعي سيمو(ځنگلونه) له منځه تلل د ساري ناروغيو انتقال ته زمينه برابروي (Ahmed, 2019).

• بيولوژيکي فکتورونه: سياحت (Tourism) او ژوپن (Zoos) له امله د انسانانو او څارويو ترمنځ نږدې پاتې کيدلو او خلکو يوځای کيدل هم د ساري ناروغيو په انتقال کې مهم رول لري چې د ناروغي په خپرېدو کې امکانات زياتوي (Mavroidi, 2008).

• وکتوري فکتورونه: ځيني وختونه Arthropods لکه مچان (mosquitoes) او کنې (ticks) چې له څارويو څخه انسانانو ته او له انسانانو څخه څارويو ته ناروغي انتقال کې د مهم فکتور په حيث خپل رول لوبوي (Huang, 2019).

• اقتصادي فکتورونه: سوي تغذیه او کمزوری روغتیایی سیستم او همدارنگه په ټوله نړۍ کې خلک څاروي د خوراک، تجارتي محصولاتو، درملو، خوراکي محصولاتو ترڅنګ لکه غوښه، شیدې، هګۍ او همدارنگه د بدن نورې برخې لکه پوستکې، وینه، ځیګر او داسې نورې برخې خرڅوي چې دغه فکتور هم خپله د ساري ناروغیو انتقال لپاره زمینه برابروي (Tajudeen, 2022; Morcatty, 2022; Cruze, 2020; van, 2022).

• فرهنگي او کلتوري فکتورونه: ټولنیز او فرهنگي فکتورونه د ساري ناروغیو د انتقال په پراختیا کې مهم رول لري، ځکه چې د انسانانو ټولنیز چلند، د ژوند طرز، کلتوري دودونه، او د ټولنې جوړښت مستقیم د انسان او حیوان ترمنځ د تماس فرصتونه زیاتوي. د لوړ نفوس لرونکو سیمو ژوند، بازارونه، مذهبي او ټولنیز مراسم، او د حیواناتو سره د کلتوري اړیکو ډولونه د ناروغیو د خپرېدو چاپېریال رامنځته کوي. په ځانګړې توګه، د حیواناتو د خوراک (خامې غوښې، شیدې)، درملنې، او تجارتي کارونې دودونه، لکه د غوښې یا حیواني محصولاتو کارول، د ساري ناروغیو د لیرېد چانس زیاتوي (Pulliam, 2012; NCBI, 2016). برسېره پردې، د ټولنیز، اقتصادي نابرابرۍ او د روغتیايي زیرمو محدودیتونه د کمزورو ټولنو د ناروغیو د خپرېدو خطر لا لوړوي (Plowright, 2017). په مجموع کې، ټولنیز او فرهنگي فکتورونه نه یوازې د ناروغیو دانتقال او خپرېدو موقعې زیاتوي، بلکې د کنټرول او وقایوي اقداماتو په تطبیق کې هم مهم اغېز لري.

• مدیریتي فکتورونه: د کمزوري بایو سیکورټي، واکسیناسیون نښکړتیاوې او میکروب ضد درملو په غیر معیاري طریقو استعمال د مدیریتي او وترنري فکتورونو اساسي برخې دي چې د ساري ناروغیو د انتقال او خپرېدو خطر زیاتوي. په فارمونو په کچه کمزوري بایو سیکورټي لکه د قرنطین غیر مؤثر تطبیق، د فارمونو غیر معیاري پاکوالی، د ناروغیو کنټرول پروتوکولونو نه شتون او همدارنگه د واکسین په معیاري ډول نه تطبیق او د میکروب ضد درملو نامناسب استعمال چې زیات وخت د تشخیص پرته د درملنې لپاره کارول کېږي د مقاومت لرونکو میکروبونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي، کوم چې نه یوازې د حیواناتو درملنه پېچلې کوي بلکې د انسان د روغتیا لپاره هم خطرناک ثابت شوی دي چې دا ټول د ناروغۍ په انتقال کې مهم رول لري (Kinfe, 2025; Ismael, 2021).

د ساري ناروغیو کنټرول او وقایه:

- هغه څاروي چې په ناروغۍ اخته شوي دي باید له روغو څارویو څخه جدا کړل شي.
- ساري ناروغیو انتقال فکتورونه باید شتخيص او له منځه یوړل شي.
- فارمونو کې باید حفظ الصحوي شرایط برابر کړل شي.
- د ساري ناروغیو مقابل کې باید انسانان او څاروي دواړه واکسین کړل شي.

پايله :

د دې څېړنې د موندنو پر بنسټ داسې پايله اخيستل کېدای شي چې ساري ناروغۍ نه يوازې د انسانانو روغتيا ته جدي گواښ پېښوي، بلکې د انسانانو او څارويو گډ ژوند، اقتصادي ثبات او د عامې روغتيا سيستمونه هم اغېزمنوي. دغه ناروغۍ د څارويو څخه انسانانو ته او همدارنگه د انسانانو څخه څارويو ته د بېلابېلو لارو له لارې انتقالېږي، چې دا چاره د ساري ناروغيو د پراخېدو اصلي لامل گڼل کېږي. د ساري ناروغيو د انتقال په بهير کې گڼ شمېر مساعده کوونکي فکتورونه رول لري، چې په عمومي ډول په څو کټگوريو وېشل کېږي. په دې کې محيطي فکتورونه لکه ښاري ژوند او د طبيعي سيمو (لکه ځنگلونو) تخريب شامل دي، چې د انسان او حيوان ترمنځ د تماس احتمال زياتوي. بيولوژيکي فکتورونه د ناروغۍ له عامل او د کوربه له ځانگړتياوو سره تړاو لري، لکه د مايکرو ارگانيزم ډول، د هغه پتالوژيک ځانگړتياوې او د کوربه معافيتي وضعيت. سربېره پر دې، عادتونه او سلوکي فکتورونه لکه د انسان او حيوان ترمنځ نږدې تماس، د ناروغۍ د انتقال په زياتوالي کې مهم رول لري. مديريتي فکتورونه لکه کمزوری بایوسکیورتي، د واکسيناسيون نيمگړتيا او د انتي مايکروبيال درملو ناسم استعمال هم د ناروغۍ د خپرېدو خطر لوړوي. همدارنگه، فرهنگي او ټولنيز فکتورونه لکه دودونه، ټولنيز چلندونه او د نفوس لوړ تمرکز، او اقتصادي فکتورونه لکه فقر، د څارويو سوداگريز استعمال او د روغتيايي امکاناتو محدوديت، د ساري ناروغيو په انتشار کې مهم رول لري. برسېره پر دې، وکتوري فکتورونه لکه مچان او کنې د ځينو ساري ناروغيو په انتقال کې منعکسېتوب کوي. ساري ناروغۍ کېدای شي د مستقيم تماس له لارې (لکه د ناروغ انسان يا حيوان سره نېغ په نېغه تماس) او يا هم د غير مستقيم تماس له لارې (لکه د اخته افرادو افرازات، ککړ وسايل، خواړه او چاپېريالي عوامل) انتقال شي.

له همدې امله، د ساري ناروغيو د اغېزمن مخنيوي او کنټرول لپاره اړينه ده چې ياد شوي فکتورونه په يوه جامع، منسجم او څو سکتوري چوکاټ کې وپېژندل شي او د عامې روغتيا او وترنري خدماتو ترمنځ همغږي پياوړې شي.

اخځلیکونه:

- Ahmed, S., Dávila, J. D., Allen, A., Haklay, M., Tacoli, C., & Fèvre, E. M. (2019). Does urbanization make emergence of zoonosis more likely? Evidence, myths and gaps. *Environment and Urbanization*, 31(2), 443–460. <https://doi.org/10.1177/0956247819866124>
- Allen, T., Murray, K. A., Zambrana-Torrel, C., Morse, S. S., Rondinini, C., Di Marco, M., & Daszak, P. (2017). Global hotspots and correlates of emerging zoonotic diseases. *Nature Communications*, 8, 1124. <https://doi.org/10.1038/s41467-017-00923-8>
- Cruze, N., Green, J., Elwin, A., & Schmidt-Burbach, J. (2020). Trading tactics: Time to rethink the global trade in wildlife. *Animals*, 10(12), 2456. <https://doi.org/10.3390/ani10122456>
- Huang, Y. J. S., Higgs, S., & Vanlandingham, D. L. (2019). Arbovirus–mosquito vector–host interactions and the impact on transmission and disease pathogenesis of arboviruses. *Frontiers in Microbiology*, 10, 22. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00022>
- Hubálek, Z. (2003). Emerging human infectious diseases: Anthroponoses, zoonoses, and sapronoses. *Emerging Infectious Diseases*, 9(3), 403–404. <https://doi.org/10.3201/eid0903.020320>
- Ismael, A., Abdella, A., Shimelis, S., Tesfaye, A., & Muktar, Y. (2021). Assessment of biosecurity status in commercial chicken farms found in Bishoftu town, Oromia regional state, Ethiopia. *Veterinary Medicine International*, 2021, Article ID 5583266. <https://doi.org/10.1155/2021/5583266>
- Jones, K. E., Patel, N. G., Levy, M. A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J. L., & Daszak, P. (2008). Global trends in emerging infectious diseases. *Nature*, 451(7181), 990–993. <https://doi.org/10.1038/nature06536>
- Keusch, G. T., Pappaioanou, M., Gonzalez, M. C., Scott, K. A., & Tsai, P. (2009). Sustaining global surveillance and response to emerging zoonotic diseases: Drivers of zoonotic diseases. National Academies Press.
- Mavroidi, N. (2008). Transmission of zoonoses through immigration and tourism. *Veterinaria Italiana*, 44(4), 651–656
- Morens, D. M., & Fauci, A. S. (2013). Emerging infectious diseases: Threats to human health and global stability. *PLoS Pathogens*, 9(7), e1003467. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1003467>
- Mortimer, P. P. (2019). Influenza: The centennial of a zoonosis. *Reviews in Medical Virology*, 29(3), e2030. <https://doi.org/10.1002/rmv.2030>
- Norris, D. E. (2004). Mosquito-borne diseases as a consequence of land use change. *EcoHealth*, 1(1), 19–24. <https://doi.org/10.1007/s10393-004-0011-x>
- Patz, J. A., Daszak, P., Tabor, G. M., Aguirre, A. A., Pearl, M., Wolfe, N. D., & Molyneux, D. (2000). Unhealthy landscapes: Policy recommendations on land

- use change and infectious disease emergence. *Environmental Health Perspectives*, 108(10), 1092–1098. <https://doi.org/10.1289/ehp.001081092>
- Plowright, R. K., Parrish, C. R., McCallum, H., Hudson, P. J., Ko, A. I., Graham, A. L., & Lloyd-Smith, J. O. (2017). Pathways to zoonotic spillover. *Nature Reviews Microbiology*, 15(8), 502–510. <https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.45>
- Pulliam, J. R. C., Dushoff, J., & Levin, S. A. (2012). Epidemiology and ecology of zoonotic diseases. NCBI Bookshelf. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK215318>
- Rahman, M. T., Sobur, M. A., Islam, M. S., Ievy, S., Hossain, M. J., El Zowalaty, M. E., & Rahman, M. (2020). Zoonotic diseases: Etiology, impact, and control. *Microorganisms*, 8(9), 1405. <https://doi.org/10.3390/microorganisms8091405>
- Tajudeen, Y. A., Oladunjoye, I. O., Bajinka, O., & Oladipo, H.J. (2022). Zoonotic spillover in an era of rapid deforestation of tropical areas and unprecedented wildlife trafficking. *Challenges*, 13(2), 41. <https://doi.org/10.3390/challenges13020041>